


DMP BRUSTKREBS: AUSWERTUNG 2024

In diesem Dokument stellt die KBV ausgewählte Daten zum Disease-Management-Programm (DMP) Brustkrebs für das Jahr 2024 zusammen. Diese beinhalten die Altersstruktur, die Entwicklung der Anzahl der eingeschriebenen Patientinnen sowie die Erreichung der Qualitätsziele.

ALTERSSTRUKTUR


Im Jahr 2024 war der größte Anteil der eingeschriebenen Patientinnen älter als 70 Jahre. Die Altersstruktur wird aus den einzelnen Berichten von 10 Gemeinsamen Einrichtungen (GE) der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zusammengefasst.



n = 24.517

ENTWICKLUNG DER ANZAHL EINGESCHRIEBENER PATIENTINNEN

Im Folgenden wird die Anzahl der im DMP Brustkrebs eingeschriebenen Patientinnen im Verlauf der Jahre von 2007 bis 2025 dargestellt. Die Zahlen stammen aus den Tätigkeitsberichten des Bundesversicherungsamtes (BVA) für die Jahre 2006 und 2007 sowie den amtlichen Statistiken des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) KM6 Teil II ab 2008 und KM7 bis 2026.



Stand: 01.01.2026

QUALITÄTSZIELERREICHUNG

Die folgenden Qualitätsziele wurden aus den indikationsspezifischen Berichten für die Gemeinsamen Einrichtungen beziehungsweise aus den Qualitätsberichten von 15 KVen zusammengefasst.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Nebenwirkungen endokriner Therapie		
Bei mindestens 95 % der Teilnehmerinnen wurden Nebenwirkungen endokriner Therapie erfragt	› alle Teilnehmerinnen mit adjuvanter endokriner Therapie › n = 58.690	› Zielwert: $\geq 95 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 97,8 %  0% 20% 40% 60% 80% 100%
Indizierte adjuvante endokrine Therapie		
Mindestens 95 % der Teilnehmerinnen erhalten aktuell eine adjuvante endokrine Therapie	› alle Teilnehmerinnen mit positivem Hormonrezeptorstatus › n = 59.888	› Zielwert: $\geq 95 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 81,2 %  0% 50% 100%
Endokrine Therapie mindestens 5 Jahre		
Mindestens 75 % der Teilnehmerinnen haben eine endokrine Therapie mindestens 5 Jahre fortgeführt	› alle Teilnehmerinnen mit positivem Hormonrezeptorstatus und adjuvanter endokriner Therapie › n = 21.431	› Zielwert: $\geq 75 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 79,6 %  0% 50% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
DXA Ergebnis bekannt		
Angemessener Anteil von Teilnehmerinnen, bei denen das DXA Ergebnis bekannt ist	› alle Teilnehmerinnen mit adjuvanter Therapie mit Aromataseinhibitoren und der Absicht für eine spezifische medikamentöse Therapie einer Osteoporose › n = 34.796	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 51,5 %  51,5% 0% 50% 100%
Kardiotoxische Tumorthherapie bekannt		
Bei mindestens 90 % der Teilnehmerinnen ist bekannt, ob eine kardiotoxische Tumorthherapie mit linksthorakaler Bestrahlung, Anthrazyklinen und/oder Anti-HER2-Substanzen stattgefunden hat	› alle Teilnehmerinnen › n = 97.329	› Zielwert: ≥ 90 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 95,8 %  95,8% 0% 50% 100%
Symptomatisches Lymphödem		
Höchstens 30 % der Teilnehmerinnen haben ein symptomatisches Lymphödem	› alle Teilnehmerinnen nach operativer Therapie › n = 67.596	› Zielwert: ≤ 30 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 18,0 %  18,0% 0% 50% 100%
Empfehlung zum körperlichen Training		
Mindestens 75 % der Teilnehmerinnen erhielten eine Empfehlung zum körperlichen Training	› alle Teilnehmerinnen › n = 97.330	› Zielwert: ≥ 75 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 92,7 %  92,7% 0% 50% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMER*INNE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Empfehlung zum körperlichen Training BMI > 30		
Mindestens 90 % der Teilnehmerinnen mit einem BMI > 30 erhielten eine Empfehlung zum körperlichen Training	› alle Teilnehmerinnen mit einem BMI > 30 › n = 19.154	› Zielwert: ≥ 90 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 93,7 %  0% 50% 100%
Bisphosphonat oder Denosumab-Therapie bei Knochenmetastasen		
Mindestens 85 % der Teilnehmerinnen erhalten Bisphosphonat oder Denosumab-Therapie bei erstmaligem Auftreten von Knochenmetastasen	› alle Teilnehmerinnen mit erstmaligem Auftreten von Knochenmetastasen › n = 1.680 Hinweis: Es wurden nur sechs KVen mit einer Grundgesamtheit über 100 TN berücksichtigt.	› Zielwert: ≥ 85 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 62,0 %  0% 50% 100%
Biopsische Sicherung viszeraler Fernmetastasen		
Adäquater Anteil von Teilnehmerinnen mit biopsischer Sicherung viszeraler Fernmetastasen	› alle Teilnehmerinnen mit erstmaligem Auftreten viszeraler Fernmetastasen › n = 315	› Kein Zielwert festgelegt › Erreichter durchschnittlicher Wert: 57,8 %  0% 50% 100%



Weitere Informationen: www.kbv.de/praxis/patientenversorgung/dmp