


DMP DIABETES MELLITUS TYP 2: AUSWERTUNG 2024

In diesem Dokument stellt die KBV ausgewählte Daten zum Disease-Management-Programm (DMP) Diabetes mellitus Typ 2 (DM2) für das Jahr 2024 zusammen. Diese beinhalten die Altersstruktur, die Entwicklung der Anzahl der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten sowie die Erreichung der Qualitätsziele.

ALTERSSTRUKTUR


Im Jahr 2024 war der größte Anteil der eingeschriebenen Patientinnen und Patienten älter als 65 Jahre. Die Altersstruktur wird aus den einzelnen Berichten von 10 Gemeinsamen Einrichtungen (GE) der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zusammengefasst.



n = 2.202.796

ENTWICKLUNG DER ANZAHL EINGESCHRIEBENER PATIENTINNEN UND PATIENTEN



Im Folgenden wird die Anzahl der im DMP DM2 eingeschriebenen Patientinnen und Patienten im Verlauf der Jahre von 2007 bis 2025 dargestellt. Die Zahlen stammen aus den Tätigkeitsberichten des Bundesversicherungsamtes (BVA) für die Jahre 2006 und 2007 sowie den amtlichen Statistiken des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) KM6 Teil II ab 2008 und KM7 bis 2026.









Stand: 01.01.2026

QUALITÄTSZIELERREICHUNG

Die folgenden Qualitätsziele wurden aus den indikationsspezifischen Berichten für die Gemeinsamen Einrichtungen beziehungsweise aus den Qualitätsberichten von 16 KVen zusammengefasst.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Vermeidung schwerer Hypoglykämien		
Weniger als 1 % der Teilnehmenden hatten eine oder mehr Hypoglykämien in den letzten 12 Monaten	› alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 3.409.759	› Zielwert: < 1 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 0,32 % 
Vermeidung notfallmäßiger stationärer Behandlungen		
Weniger als 1 % der Teilnehmenden hatten eine oder mehrere notfallmäßige stationäre Behandlungen wegen Diabetes in den letzten 6 Monaten	› alle Teilnehmenden mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 3.678.748	› Zielwert: < 1 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 0,22 % 
Verordnung von Metformin (Monotherapie)		
Mindestens 70 % der Teilnehmenden erhalten unter Monotherapie mit einem Antidiabetikum Metformin	› alle Teilnehmenden unter Monotherapie mit einem Antidiabetikum › n = 1.553.173	› Zielwert: ≥ 70 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 82,5 % 

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Augenärztliche Netzhautuntersuchung		
Bei mindestens 90 % der Teilnehmenden wurde eine augenärztliche Untersuchung in den letzten 24 Monaten durchgeführt	› alle Teilnehmenden mit mindestens 24 Monate Teilnahmedauer am DMP › n = 2.951.680	› Zielwert: $\geq 90 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 67,0 %  A horizontal bar chart with a scale from 0% to 100%. A magenta bar extends to the 67,0% mark. The text '67,0%' is placed at the end of the bar.
Verordnung eines Thrombozytenaggregationshemmers		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden mit Makroangiopathie erhalten einen Thrombozytenaggregationshemmer	› alle Teilnehmenden mit AVK, KHK oder Schlaganfall ohne Kontraindikation und ohne orale Antikoagulation › n = 814.204	› Zielwert: $\geq 80 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 69,0 %  A horizontal bar chart with a scale from 0% to 100%. A magenta bar extends to the 69,0% mark. The text '69,0%' is placed at the end of the bar.
HbA1c-Wert von $> 8,5 \%$ (69 mmol / mol)		
Höchstens 10 % der Teilnehmenden haben einen HbA1c-Wert von $> 8,5 \%$ (69 mmol / mol)	› alle Teilnehmenden › n = 4.128.004	› Zielwert: $\leq 10 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 7,4 %  A horizontal bar chart with a scale from 0% to 100%. A magenta bar extends to the 7,4% mark. The text '7,4%' is placed at the end of the bar.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Erreichen des individuell vereinbarten HbA1c-Zielwertes		
Mindestens 60 % der Teilnehmenden haben ihren individuell vereinbarten HbA1c-Zielwert erreicht	› alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 3.433.065	› Zielwert: $\geq 60 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 65,1 %  A horizontal bar chart with a pink bar representing 65.1% of the total length. The x-axis is labeled from 0% to 100% with a midpoint at 50%.
Erreichen von normotensiven Blutdruckwerten		
Mindestens 45 % der Teilnehmenden mit bekannter Hypertonie haben einen Blutdruck $\leq 139 / 89$ mmHg	› alle Teilnehmenden mit einer bekannten Hypertonie › n = 3.299.006	› Zielwert: $\geq 45 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 56,8 %  A horizontal bar chart with a pink bar representing 56.8% of the total length. The x-axis is labeled from 0% to 100% with a midpoint at 50%.
Systolischen Blutdruck > 150 mmHg		
Höchstens 15 % der Teilnehmenden mit bekannter Hypertonie haben einen systolischen Blutdruck von > 150 mmHg	› alle Teilnehmenden mit einer bekannten Hypertonie › n = 3.299.006	› Zielwert: $\leq 15 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 13,5 %  A horizontal bar chart with a pink bar representing 13.5% of the total length. The x-axis is labeled from 0% to 100% with a midpoint at 50%.
Nierenfunktion (eGFR)		
Bei mindestens 90 % der Teilnehmenden wurde die eGFR in den letzten 12 Monaten bestimmt	› alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 3.431.910	› Zielwert: $\geq 90 \%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 91,5 %  A horizontal bar chart with a pink bar representing 91.5% of the total length. The x-axis is labeled from 0% to 100% with a midpoint at 50%.

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMER*DE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Behandlung / Mitbehandlung des diabetischen Fußes in spezialisierter Einrichtung		
Bei mindestens 65 % der Teilnehmenden mit Fußläsionen mit oberflächlicher Wunde mit Ischämie und allen Teilnehmenden mit tiefen Ulzera wurde eine Behandlung / Mitbehandlung in einer für das diabetische Fußsyndrom qualifizierten Einrichtung veranlasst	› alle Teilnehmenden mit oberflächlicher Wunde mit Ischämie und alle Teilnehmenden mit tiefen Ulzera mit mindestens 6 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 27.481	› Zielwert: $\geq 65\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 51,1 %  51,1% 0% 50% 100%
Erhebung des Fußstatus in den letzten 12 Monaten		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden haben in den letzten 12 Monaten eine komplette Untersuchung des Fußstatus erhalten	› alle Teilnehmenden mit mindestens 12 Monaten Teilnahmedauer am DMP › n = 3.433.131	› Zielwert: $\geq 80\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 86,4 %  86,4% 0% 50% 100%
Pulsstatus bei Ulkus		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden mit einem Ulkus, bei denen gleichzeitig der Pulsstatus untersucht wurde	› alle Teilnehmenden mit einem Ulkus › n = 44.722	› Zielwert: $\geq 80\%$ › Erreichter durchschnittlicher Wert: 88,4 %  88,4% 0% 50% 100%

QUALITÄTSZIEL	BERÜCKSICHTIGTE TEILNEHMENDE	ZIELWERT UND ERREICHTER DURCHSCHNITTLICHER WERT
Intervalle für künftige Fußinspektionen		
Mindestens 80 % der Teilnehmenden bei denen angemessene Intervalle für künftige Fußinspektionen festgelegt wurden	› alle Teilnehmenden ≥ 18 Jahre mit Sensibilitätsstörung › n = 356.942	› Zielwert: ≥ 80 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 53,1 %  53,1% 0% 50% 100%
Metformin plus SGLT2-Inhibitor oder GLP-1-Rezeptorantagonisten		
Mindestens 60 % der Teilnehmenden mit KHK, Herzinfarkt, chronischer Herzinsuffizienz, Schlaganfall oder eGFR < 60 ml/min/1,73m ² KOF erhalten eine Kombinationstherapie mit Metformin plus SGLT2-Inhibitor oder GLP-1-Rezeptorantagonisten	› alle Teilnehmenden bei denen eine KHK, ein Herzinfarkt, chronische Herzinsuffizienz, Schlaganfall oder eGFR < 60 ml/min/1,73m² KOF dokumentiert wurde und bei denen keine Kontraindikationen gegen Metformin oder SGLT2-Inhibitor und GLP-1-Rezeptorantagonist besteht › n = 1.570.500	› Zielwert: ≥ 60 % › Erreichter durchschnittlicher Wert: 22,1 %  22,1% 0% 50% 100%



Weitere Informationen: www.kbv.de/praxis/patientenversorgung/dmp